

Artenliste Heuschrecken Kühkopf-Knoblochsau

K. Handke 2007

Rote Liste BRD: INGRISCH & KÖHLER (1998), RL Hessen: GRENZ & MALTEN (1996), 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung anzunehmen, D = Daten defizitär; * INGRISCH (1979), MALTEN (unveröff) (Anfang der 80er Jahre)

■ = häufig, ○ = verbreitet bzw. stellenweise häufiger, x = vereinzelt

| | deutscher Name | lat. Name | RL BRD | RL Hessen | Aktueller Status | Nachweise 06-07 | Nachweise 01-03 | Alte Funde* | Grünland | Röhrichte/Feuchtbrachen | Wald/Gehölze | Halbtrockenrasen/ trockene Ruderalfluren | offene Bodenflächen |
|----|------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|-------------------------|--------------|---|---------------------|
| 1 | Gemeine Sichelschrecke | <i>Phaneroptera falcata</i> | | | ○ | X | X | X | X | X | | X | |
| 2 | Punktierte Zartschrecke | <i>Leptophyes punctatissima</i> | | | ○ | X | X | X | X | X | X | X | |
| 3 | Gemeine Eichenschrecke | <i>Meconema thalassinum</i> | | | ○ | X | | X | | | X | | |
| 4 | Südliche Eichenschrecke | <i>Meconema meridionale</i> | | D | x | X | | | | | X | | |
| 5 | Langflüglige Schwertschrecke | <i>Conocephalus discolor</i> | | | ■ | X | X | X | X | X | | X | |
| 6 | Kurzflüglige Schwertschrecke | <i>Conocephalus dorsalis</i> | 3 | 3 | | | X | X | X | X | | X | |
| 7 | Grünes Heupferd | <i>Tettigonia viridissima</i> | | | ■ | X | X | X | X | X | X | X | |
| 8 | Roesels Beißschrecke | <i>Metrioptera roeseli</i> | | | ■ | X | X | X | X | X | | X | |
| 9 | Zweifarbige Beißschrecke | <i>Metrioptera bicolor</i> | | 3 | x | X | | X | X | | | X | |
| 10 | Gewöhnliche Strauschschrecke | <i>Pholidoptera griseoaptera</i> | | | ○ | X | X | X | | | X | | |
| 11 | Feldgrille | <i>Gryllus campestris</i> | 3 | 3 | | | X | X | X | | | X | |
| 12 | Waldgrille | <i>Nemobius sylvestris</i> | | | | | X | X | X | | X | X | |
| 13 | Weinhähnchen | <i>Oecanthus pullens</i> | | 3 | x | X | X | X | X | | | X | |
| 14 | Säbel-Dornschröcke | <i>Tetrix subulata</i> | | V | ○ | X | X | X | X | X | | X | X |
| 15 | Gemeine Dornschröcke | <i>Tetrix undulata</i> | | | ○ | X | X | X | X | | | X | X |
| 16 | Langfühler-Dornschröcke | <i>Tetrix tenuicornis</i> | | | ○ | X | X | X | X | | | X | X |
| 17 | Blaufügelige Ödlandschröcke | <i>Oedipoda caerulea</i> | 3 | 3 | x | X | X | X | | | | | X |
| 18 | Sumpfschröcke | <i>Stethophyma grossum</i> | 2 | 3 | ○ | X | X | X | X | X | | | |
| 19 | Lauschschrecke | <i>Parapleurus alliaceus</i> | 2 | 1 | ■ | X | X | X | X | X | | | |
| 20 | Große Goldschrecke | <i>Chrysochraon dispar</i> | 3 | 3 | ○ | X | X | X | X | X | | | |
| 21 | Rote Keulenschrecke | <i>Gomphocerus rufus</i> | | V | x | X | | | | | X | | |
| 22 | Nachtigall-Grashüpfer | <i>Chorthippus biguttulus</i> | | | ■ | X | X | X | X | | | X | X |
| 23 | Brauner Grashüpfer | <i>Chorthippus brunneus</i> | | | ○ | X | X | X | X | | | X | X |
| 24 | Wiesengrashüpfer | <i>Chorthippus dorsatus</i> | | 3 | ■ | X | X | X | X | X | | X | |
| 25 | Weißrandiger Grashüpfer | <i>Chorthippus albomarginatus</i> | | | ○ | X | X | X | X | X | | | |
| 26 | Gemeiner Grashüpfer | <i>Chorthippus parallelus</i> | | | ■ | X | X | X | X | X | | X | |
| | Gesamtartenzahl | | | | | 23 | 22 | 24 | | | | | |